



L'association SIC

-
Soutien à l'**I**nsuffisance
Cardiaque




Philippe Muller

Président de l'association pour le soutien à l'insuffisance cardiaque (SIC)




Le Patient Face à l'Insuffisance Cardiaque



Phase d'hospitalisation

Entouré et protégé du
monde extérieur

Le patient au centre du système de soin



État de sidération

Adaptation à un nouveau
mode de vie

Le parcours de soin de l'IC : Etude IC-PS2




FIGURE 1 Patient care pathway, from the symptom-appearing phase to the post-hospital phase


- 793 patients interrogés après une décompensation cardiaque (≈ 72 ans)
- Symptômes connus depuis plus de 15 jours : **47% des patients**
- Entrée dans l'hôpital : Cardiologue 19.5%, Généraliste 22%, Lui 17%, SAMU/pompiers : 42%
- Une sortie d'hospitalisation à 76 % à domicile, à 12 % réadaptation et 6 % en maison de repos

La consultation d'annonce



**Beaucoup de patients
quittent l'hôpital sans
savoir de quoi ils souffrent**

Le soutien psychologique



**Aspect psychologique
non pris en compte**

L'accompagnement



**Encadrer le patient au
quotidien**



Notre objectif



**AIDER
ACCOMPAGNER
SOUTENIR**



sic-asso.org