

Le dépistage systématique des violences interpersonnelles en médecine générale

Dre Lydia AMRANE

Dre Julie DIDIER

Je déclare n'avoir aucun lien d'intérêt

DANS LE MONDE

- 1 personne sur 5 en emploi a rencontré une forme de violence

EN EUROPE

- 1 femme sur 3 est victime de violences physiques et/ou sexuelles
- Les violences concernent actuellement 117 millions d'enfants

EN FRANCE

- Chaque médecin généraliste reçoit entre 2 et 3 femmes victimes de violences conjugales chaque jour



Coût des violences



Rôle du médecin
généraliste




Débat et réticence des
médecins généralistes


OBJECTIF
PRINCIPAL

Décrire la prévalence des violences interpersonnelles lorsqu'un dépistage systématique est réalisé, les types de violences et le domaine dans lesquels elles sont rencontrées.

OBJECTIFS
SECONDAIRES


Décrire la présence de pathologies chroniques et de conduites addictives, la prise d'un traitement à visée psychiatrique, la prévalence d'un surpoids ou d'une obésité et la fréquence des consultations trimestrielles






Variables	Sans Violences (n = 123)	Avec Violences (n = 147)	Total	p-valeur
Genre				0,05
Homme	57 (46.34 %)	51 (34.69 %)	108	
Femme	66 (53.66 %)	96 (65.31 %)	162	
Tranche d'âge au dépistage				0,08
18-30	7 (5.69 %)	18 (12.24 %)	25	
31-40	21 (17.07 %)	21 (14.29 %)	42	
41-50	21 (17.07 %)	20 (13.61 %)	41	
51-60	14 (11.38 %)	34 (23.13 %)	48	
61-70	29 (23.58 %)	31 (21.09 %)	60	
71-80	22 (17.89 %)	16 (10.88 %)	38	
81-90	7 (5.69 %)	6 (4.08 %)	13	
91-99	2 (1.63 %)	1 (0.68 %)	3	
Niveau d'études				0,41
Aucun	5 (4.39 %)	8 (6.35 %)	13	
Brevet	20 (17.54 %)	16 (12.70 %)	36	
Baccalauréat ou équivalent	45 (39.47 %)	44 (34.92 %)	89	
Licence/BTS *	32 (28.07 %)	40 (31.74 %)	70	
Master	13 (11.4 %)	14 (11.11 %)	27	
Doctorat	1 (0.88 %)	4 (3.17 %)	5	
Données manquantes	9 (7.32 %)	21 (14.29 %)	30	
Catégories socio-professionnelles				
Artisans, Commerçants	6 (4.88 %)	8 (5.44 %)	14	0,83
Cadres	14 (11.38 %)	13 (8.84 %)	27	0,48
Invalidité/AAH †	3 (2.44 %)	1 (0.68 %)	4	0,24
Étudiant	3 (2.44 %)	9 (6.12 %)	12	0,14
Ouvrier	11 (8.94 %)	5 (3.4 %)	16	0,05
Retraité	48 (39.02 %)	46 (31.29 %)	94	0,18
Salarié	28 (22.76 %)	52 (35.3 %)	80	0,02
Chômage/RSA ‡	9 (7.3 %)	11 (7.5 %)	20	0,12
Données manquantes	4 (3.23 %)	6 (4.08 %)	10	
Situation maritale				0,001
Célibataire	15 (12.4 %)	21 (16.03 %)	36	
Divorcé / Séparé	16 (13.22 %)	32 (24.43 %)	48	
En couple / Marié / Pacsé	85 (70.25 %)	72 (54.96 %)	157	
Veuf	5 (4.13 %)	6 (4.58 %)	11	
Données manquantes	2 (1.63 %)	16 (10.88 %)	18	

Variables	Sans Violences (n = 123)	Avec Violences (n = 147)	Total	p-valeur
Genre				0,05
Homme	57 (46.34 %)	51 (34.69 %)	108	
Femme	66 (53.66 %)	96 (65.31 %)	162	
Tranche d'âge au dépistage				0,08
18-30	7 (5.69 %)	18 (12.24 %)	25	
31-40	21 (17.07 %)	21 (14.29 %)	42	
41-50	21 (17.07 %)	20 (13.61 %)	41	
51-60	14 (11.38 %)	34 (23.13 %)	48	
61-70	29 (23.58 %)	31 (21.09 %)	60	
71-80	22 (17.89 %)	16 (10.88 %)	38	
81-90	7 (5.69 %)	6 (4.08 %)	13	
91-99	2 (1.63 %)	1 (0.68 %)	3	
Niveau d'études				0,41
Aucun	5 (4.39 %)	8 (6.35 %)	13	
Brevet	20 (17.54 %)	16 (12.70 %)	36	
Baccalauréat ou équivalent	45 (39.47 %)	44 (34.92 %)	89	
Licence/BTS *	32 (28.07 %)	40 (31.74 %)	70	
Master	13 (11.4 %)	14 (11.11 %)	27	
Doctorat	1 (0.88 %)	4 (3.17 %)	5	
Données manquantes	9 (7.32 %)	21 (14.29 %)	30	
Catégories socio-professionnelles				
Artisans, Commerçants	6 (4.88 %)	8 (5.44 %)	14	0,83
Cadres	14 (11.38 %)	13 (8.84 %)	27	0,48
Invalidité/AAH †	3 (2.44 %)	1 (0.68 %)	4	0,24
Étudiant	3 (2.44 %)	9 (6.12 %)	12	0,14
Ouvrier	11 (8.94 %)	5 (3.4 %)	16	0,05
Retraité	48 (39.02 %)	46 (31.29 %)	94	0,18
Salaré	28 (22.76 %)	52 (35.3 %)	80	0,02
Chômage/RSA ‡	9 (7.3 %)	11 (7.5 %)	20	0,12
Données manquantes	4 (3.23 %)	6 (4.08 %)	10	
Situation maritale				0,001
Célibataire	15 (12.4 %)	21 (16.03 %)	36	
Divorcé / Séparé	16 (13.22 %)	32 (24.43 %)	48	
En couple / Marié / Pacsé	85 (70.25 %)	72 (54.96 %)	157	
Veuf	5 (4.13 %)	6 (4.58 %)	11	
Données manquantes	2 (1.63 %)	16 (10.88 %)	18	



Types de violences rencontrées



Domaine des violences

Critères secondaires

Variable	Sans Violences (n = 123)	Avec Violences (n = 147)	Total	p-valeur
Tabagisme				0,03
Oui	22 (21.8 %)	33 (31.4 %)	55	
Sevré	31 (30.7 %)	20 (19.0 %)	51	
Non	48 (47.5 %)	52 (49.5 %)	100	
DM *	22 (17.9 %)	42 (28.6 %)	64	
Alcoolisme				0,14
Oui	13 (13.1 %)	15 (14.7 %)	28	
Sevré	3 (3.0 %)	1 (1.0 %)	4	
Non	83 (83.8 %)	86 (84.3 %)	169	
DM *	24 (19.51 %)	45 (30.61 %)	69	
Drogues				0,03
Oui	2 (2.0 %)	7 (7.0 %)	9	
Sevré	4 (4.0 %)	5 (5.0 %)	9	
Non	94 (94.0 %)	88 (88.0 %)	182	
DM *	23 (18.70 %)	47 (31.9 %)	70	
Traitement psychiatrique				<0.001
Oui	10 (8.13 %)	42 (28.57 %)	52	
Non	113 (91.87%)	101 (71.43%)	214	
DM *	0 (0 %)	4 (2.7 %)	4	
Maladie Chronique				
Allergique	1 (0.82 %)	4 (2.72 %)	5	0,25
Pneumologique	9 (7.38 %)	15 (10.2 %)	24	0,4
Gynécologique	0 (0 %)	3 (2.04 %)	3	0,11
Auto-Immune	1 (0.82 %)	2 (1.36 %)	3	0,66
Digestive	15 (12.3 %)	27 (18.37 %)	42	0,16
Psychiatrique	4 (3.28 %)	29 (19.73 %)	33	<0.001
Néoplasique	11 (9.02 %)	8 (5.44 %)	19	0,26
Dermatologique	4 (3.28 %)	1 (0.68 %)	5	0,12
Endocrinologique	20 (16.4 %)	32 (21.77 %)	52	0,25
Cardiovasculaire	42 (34.4 %)	45 (30.61 %)	87	0,54
Rhumatologique	26 (21.3 %)	34 (23.13 %)	60	0,7
Neurologique	1 (0.88 %)	10 (6.8 %)	11	0,01
Autres	13 (10.7 %)	11 (7.48 %)	24	0,37
Aucune	41 (33.6 %)	36 (24.49 %)	77	0,1
DM *	1 (0.81 %)	0	1	

DM * : données manquantes

Critères secondaires

Variable	Sans Violences (n = 123)	Avec Violences (n = 147)	Total	p-valeur
Tabagisme				0,03
Oui	22 (21.8 %)	33 (31.4 %)	55	
Sevré	31 (30.7 %)	20 (19.0 %)	51	
Non	48 (47.5 %)	52 (49.5 %)	100	
DM *	22 (17.9 %)	42 (28.6 %)	64	
Alcoolisme				0,14
Oui	13 (13.1 %)	15 (14.7 %)	28	
Sevré	3 (3.0 %)	1 (1.0 %)	4	
Non	83 (83.8 %)	86 (84.3 %)	169	
DM *	24 (19.51 %)	45 (30.61 %)	69	
Drogues				0,03
Oui	2 (2.0 %)	7 (7.0 %)	9	
Sevré	4 (4.0 %)	5 (5.0 %)	9	
Non	94 (94.0 %)	88 (88.0 %)	182	
DM *	23 (18.70 %)	47 (31.9 %)	70	
Traitement psychiatrique				<0.001
Oui	10 (8.13 %)	42 (28.57 %)	52	
Non	113 (91.87%)	101 (71.43%)	214	
DM *	0 (0 %)	4 (2.7 %)	4	
Maladie Chronique				
Allergique	1 (0.82 %)	4 (2.72 %)	5	0,25
Pneumologique	9 (7.38 %)	15 (10.2 %)	24	0,4
Gynécologique	0 (0 %)	3 (2.04 %)	3	0,11
Auto-Immune	1 (0.82 %)	2 (1.36 %)	3	0,66
Digestive	15 (12.3 %)	27 (18.37 %)	42	0,16
Psychiatrique	4 (3.28 %)	29 (19.73 %)	33	<0.001
Néoplasique	11 (9.02 %)	8 (5.44 %)	19	0,26
Dermatologique	4 (3.28 %)	1 (0.68 %)	5	0,12
Endocrinologique	20 (16.4 %)	32 (21.77 %)	52	0,25
Cardiovasculaire	42 (34.4 %)	45 (30.61 %)	87	0,54
Rhumatologique	26 (21.3 %)	34 (23.13 %)	60	0,7
Neurologique	1 (0.88 %)	10 (6.8 %)	11	0,01
Autres	13 (10.7 %)	11 (7.48 %)	24	0,37
Aucune	41 (33.6 %)	36 (24.49 %)	77	0,1
DM *	1 (0.81 %)	0	1	

DM * : données manquantes

Dépistage systématique

Bonneau R. Acceptabilité d'un dépistage systématique des violences interpersonnelles en médecine générale. 29 oct 2019

Pathologies neurologiques

- Tietjen GE. The relationship of childhood adversity and migraine and the value of prospective studies. Headache J Head Face Pain. 2022
- Anda R, Tietjen G, Schulman E, Felitti V, Croft J. Adverse Childhood Experiences and Frequent Headaches in Adults. Headache J Head Face Pain. 2010

Surpoids et obésité

Wiss DA, Brewerton TD. Adverse Childhood Experiences and Adult Obesity: A Systematic Review of Plausible Mechanisms and Meta-Analysis of Cross-Sectional Studies. Physiol Behav. 1 sept 2020

Pour conclure

Données similaires dans la littérature

Plusieurs plans de lutte contre les violences

- Kit de prévention et d'accompagnement
- UAPED
- La Maison des Femmes
- Le plan Grenelle
- Convention d'Istanbul

Le dépistage systématique des violences interpersonnelles en médecine générale

Dre Lydia AMRANE

Dre Julie DIDIER

Je déclare n'avoir aucun lien d'intérêt