

i-Share.fr

TA SANTÉ EN QUESTIONS

Transition du tabagisme vers l'usage d'e-cigarettes chez des étudiants français. Recherche par méthode mixte multi-étapes

S. Kinouani^{1,2}, H. Da Cruz¹, Simon M², G. Perret¹, M. Abraham¹, C. Tzourio¹

¹ Univ. Bordeaux, INSERM, BPH, U1219, F-33000 Bordeaux, France

² Département de médecine générale, Univ. Bordeaux, F-33000 Bordeaux, France

Aucun lien d'intérêt




Figure 1 : Prévalences du vapotage actuel et du vapotage quotidien chez les 18-75 ans en France métropolitaine entre 2014 et 2022¹




Figure 2 : Prévalences du vapotage actuel chez les adultes américains en fonction de l'âge en 2019 et 2023²

E-cigarettes	2017	2022
Expérimentation	52,4	56,9
Usage quotidien	1,9	6,2

Tableau 1 : Prévalences du vapotage chez les adolescents français de 17 ans³

1. Pasquereau A, et al. Prévalence du tabagisme et du vapotage en France métropolitaine en 2022 parmi les 18-75 ans. BEH 2023;(9-10):152-8.
2. Vahratian A, et al. Electronic cigarette use among adults in the United States, 2019–2023. NCHS Data Brief 2025;524.
3. OFDT. Les drogues à 17 ans. Analyse de l'enquête ESCAPAD 2022. Tendances 2023;155.

Objectif général

Décrire l'usage d'e-cigarettes chez les étudiants fumeurs de l'Université de Bordeaux

Objectifs spécifiques

- Estimer les prévalences d'usage d'e-cigarettes (vapotage) globalement puis en fonction du statut tabagique
 - Expérimentation
 - Usage actuel
- Décrire la trajectoire diachronique d'usage d'e-cigarettes des étudiants fumeurs




Figure 3 : Schéma d'étude

Phase séquentielle explicative → Phase convergente parallèle

- Association entre usage d'e-cigarette et statut tabagique
- 3 étapes de trajectoire
 - Expérimentation
 - Engagement personnel dans l'usage
 - Intensification dans l'usage
- Engagement personnel favorisé par la problématisation du tabac

← Phase
intégrative →

- Expérimentation : 41 %
- Usage actuel : 7 %
 - 79,5 % de fumeurs
 - 18,2 % d'anciens fumeurs
 - 2,3 % de non-fumeurs
- Problématisation du tabac : nécessaire mais pas suffisante pour poursuivre le vapotage




Figure 4 : Modèle intégratif de théorisation



- Prévalence élevée de l'expérimentation pour un usage actuel faible
- Comportement surtout de fumeurs et anciens fumeurs
- Trajectoire chez les fumeurs en 3 étapes, favorisée par
 - Présence d'autres vapoteurs et la curiosité (expérimentation)
 - Engagement personnel (poursuite)
 - Problématisation du tabac (expérimentation et poursuite)

Merci pour votre attention !



Kinouani S, Da Cruz H, Simon M, Abraham M, Perret G, Langlois E, Tzourio C. The transition from cigarette smoking to the exclusive or partial use of e-cigarettes: A multi-stage mixed methods study among French university students. *Addictive Behaviors* 2025;161:108205.

Poster 101

sherazade.kinouani@u-bordeaux.fr

*Financement programme Priorité Tabac 2017 de
l'Institut National du Cancer (INCa_11502)*



*C. Tzourio a reçu le prix coup d'élan pour la
recherche en 2012 pour le projet i-Share*